

# MPSS

In dieser Umfrage sind 14 Fragen enthalten.

## MPSS - Mainzer Stadienmodell der Schmerzchronifizierung (nach Gerbershagen)

### Achse 1: zeitliche Aspekte \*

#### Auftretungshäufigkeit \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

einmal täglich oder seltener

mehrmals täglich

dauernd

#### Dauer \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

bis zu mehreren Stunden

mehrere Tage

länger als eine Woche

### Intensitätswechsel \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

häufig

gelegentlich

nie

### Achse 2: räumliche Aspekte \*

### Schmerzbild \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

monolokulär

bilokulär

multilokulär oder Panalgesie

### Achse 3: Medikamenteneinnahmeverhalten \*

### Medikamenteneinnahme \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

unregelmäßiger Gebrauch von maximal zwei peripheren Analgetika

maximal drei periphere Analgetika, höchstens zwei regelmäßig

regelmäßig mehr als zwei periphere Analgetika oder zentral wirkende Analgetika

### Anzahl der Entzugsbehandlungen \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

keine Entzugsbehandlung

eine Entzugsbehandlung

mehr als eine Entzugsbehandlung

### Achse 4: Patientenkarriere \*

### Wechsel des persönlichen Arztes \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

kein Wechsel

maximal drei Wechsel

mehr als drei Wechsel

### Schmerzbedingte Krankenhausaufenthalte \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

bis zu einem

zwei bis drei

mehr als drei

### Schmerzbedingte Operationen \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- bis zu einer
- zwei bis drei
- mehr als drei

### Schmerzbedingte Rehabilitationsmaßnahmen \*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- bis zu einer
- zwei bis drei
- mehr als drei

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:  
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

MUSTER